Gale : prise en charge et traitements – réalisé par l'Agence Régionale de Santé du Nord – Pas-de-Calais

			GALE COMMUNE	GALE PROFUSE
EPIDEMIOLOGIE	**Agent infectieux**		Sarcoptes scabiei hominis	
			5-15 sarcoptes	> 100 sarcoptes
	Réservoir		Strictement humain, cutané	
	Transmission		- essentiellement interhumaine directe par contacts cutanés ; - possiblement indirecte via les effets/objets textiles, surtout en cas de gale profuse.	
	Contagiosité		favorisée par la promiscuité, propice à la multiplication des contacts directs et indirects (milieu familial, collectivités d'enfants, de personnes âgées ou dépendantes).	
			Contagiosité forte	Contagiosité extrême
	Incubation		de quelques jours (surtout en cas de réinfestation) à 6 semaines, en moyenne 1 mois	
DIAGNOSTIC CLINIQUE ET PARACLINIQUE	**Principalement clinique**		**Tableau typique :** - Prurit : d'autant plus évocateur qu'il est à recrudescence nocturne, et collectif. - Lésions spécifiques : sillons, vésicules perlées, et papulo-nodules, prédominant aux espaces interdigitaux dorsaux des mains, à la face antérieure des poignets, des coudes, des plis axillaires, des fesses, des aréoles mammaires chez la femme et des organes génitaux externes chez l'homme. Le dos, le cou et le visage sont le plus souvent épargnés. - Lésions aspécifiques secondaires : lésions de grattage, impétigo, eczéma. **Tableaux atypiques :** - Formes pauci symptomatiques : gale débutante, gale dans un contexte d'hygiène méticuleuse. - Forme du nourrisson : prurit inconstant, présence de lésions palmo-plantaires, et prédominance des lésions secondaires.	**2 formes :** - Gale disséminée inflammatoire : éruption rouge vif, sans sillons, pustuleuse et vésiculeuse, très prurigineuse ; concerne souvent des personnes âgées grabataire vivant en institution. - Gale hyperkératosique : érythrodermie généralisée, avec hyperkératose ; prurit inconstant ; concerne souvent des sujets immunodéprimés ou des personnes âgées.
	Paraclinique		- Prélèvement par grattage de la papule non excoriée à l'extrémité d'un sillon à l'aide d'un vaccinostyle puis examen parasitologique direct au microscope. - Parfois utile pour confirmer le diagnostic devant une forme atypique $^{et}/_{ou}$ en l'absence de contexte épidémiologique évocateur.	
TRAITEMENT : il doit toujours inclure les 3 composantes suivantes	**Individus** (Cf. tableaux des produits acaricides)	QUI ?	Le(s) patient(s) porteur(s) de la gale + l'entourage proche, même asymptomatique : famille vivant sous le même toit, petit(e) ami(e)	
			Si épidémie, discuter l'extension de la prophylaxie à d'autres sujets contacts.	Discuter l'extension de la prophylaxie à d'autres sujets contacts.
		COMMENT ?	- Traitement oral ou traitement local à J0 - Réévaluation à J15 : ➔ retraiter si signes d'évolution = présence de lésions spécifiques $^{et}/_{ou}$ examen parasitologique + (la persistance du prurit jusqu'à 8 à 15 jours n'est pas forcément un signe d'échec thérapeutique) ➔ vigilance si antécédents d'échec thérapeutique	Traitement oral recommandé $^{+}/_{-}$ association à un traitement local d'emblée + répétition du traitement systématique à J15 recommandée
	Environne-ment (Cf. tableaux des produits acaricides)	QUOI ?	- Les vêtements y compris bonnets, gants, chaussures. - Le linge de maison : linge de toilette, linge de lit, etc. - Les objets textiles : jouets en tissus, peluches, etc. - Le mobilier textile : fauteuils, canapés, matelas, sièges de voiture, etc.	NB : objets, mobiliers, surfaces non textiles : désinfection non justifiée !
			Utilisés par le malade depuis 48 à 72h	Utilisés par le malade depuis 8 à 10 jours
		COMMENT ?	- Lavage à 60°en machine pour le linge supportant c ette température de lavage. - Utilisation d'un produit acaricide pour le linge ne supportant pas un lavage à 60°, les objets/mobili ers textiles : ▪ Soit en mettant en sac plastique et en pulvérisant le produit acaricide dans le sac ; laisser agir dans le sac fermé le temps recommandé par le mode d'emploi du produit (en général 4 heures), puis le linge peut être lavé comme habituellement, et les objets aspirés. ▪ Soit en pulvérisant directement les objets/mobiliers textiles volumineux (fauteuils, canapés, matelas, sommiers, moquette, etc.) ; là encore, laisser agir le temps recommandé par le mode d'emploi du produit, puis aspirer. - Mise en quarantaine : en l'absence de produit acaricide, il est possible de désinfecter le linge en l'enfermant en sac plastique pendant 4 jours en cas de gale commune, ou 8 jours en cas de gale profuse.	
	Eviction/ isolement	QUOI ?	- Il peut s'agir selon les cas d'une éviction scolaire, d'un arrêt maladie, de l'isolement contact d'un résident en institution ou d'un patient en hospitalisation. - Ces mesures ne concernent que le(s) sujet(s) malade(s).	
		DUREE ?	Pendant 3 jours à compter de la mise en œuvre du traitement.	Jusqu'à négativation de l'examen parasitologique.

TRAITEMENT ORAL					
Forme galénique	Comprimés non sécables à 3 mg				
DCI/spécialité	**Ivermectine / STROMECTOL®**				
Action	Acaricide sur le sarcopte adulte, pas d'action sur les œufs.				
Mode d'administration	- Prise orale unique. - A jeun, 2 heures avant et 2 heures après. - Comprimés pouvant être écrasés si nécessaire. - Posologie de 200µg/kg, soit 1cp à 3mg par 15kg de poids corporel soit:				
	poids	15 à 24kg	25 à 35kg	36 à 50kg	> à 51kg
	# cp	1 cp	2 cp	3 cp	4 cp
Contre indications	- **Enfant de moins de 15kg** - Hypersensibilité à l'un des composants - Déconseillé au premier trimestre de la grossesse				
Remboursement SS	Oui, remboursement à 65%				

TRAITEMENT LOCAL		
Forme galénique	Lotion (flacon 125ml = ttt de 2 adultes)	spray
DCI/spécialité	**Benzoate de benzyle / ASCABIOL®**	**Esdépalléthrine, Butoxyde de piperonyle / SPREGAL®**
Action	Acaricide sur tous les stades du cycle parasitaire : œufs, larves, adultes	
Mode d'administration	Application de préférence le soir. Commencer par une douche ou un bain prolongé, avec savonnage en insistant sur les zones les plus touchées, séchage doux.	
	- Badigeon sur l'ensemble du corps sauf visage et cuir chevelu. - 2 couches successives à 15 minutes d'intervalle. - Laisser agir 24heures. ⚠ ***Femmes enceintes et enfants de moins de 2 ans*** *:* - *une seule couche, d'une durée inférieure à 12 heures, voire 8 heures chez le nourrisson de moins de 6 mois* - *bander les mains des petits pour éviter une ingestion accidentelle*	- Pulvérisation sur l'ensemble du corps sauf visage et cuir chevelu. - Si lésions sur le visage : appliquer avec un coton imbibé du produit. - Protéger les yeux, le nez et la bouche avec un linge. - 1 seule couche. - Laisser agir 12 heures.
	Au terme de la durée d'application, rincer par une douche ou un bain prolongé avec savonnage.	
Contre indications	- Hypersensibilité à l'un des composants	- Hypersensibilité à l'un des composants ; - Sujets asthmatiques ; - Nourrissons et jeunes enfants ayant des antécédents de bronchite dyspnéisante avec sibilants.
Remboursement SS	Non	Non

TRAITEMENT DE L'ENVIRONNEMENT (penser aux autres méthodes de traitement de l'environnement, décrites au recto)	
Forme galénique	aérosol
DCI/spécialité	Néopynamine forte, Sumithrine **/ A-PAR®**
Action	Antiparasitaire utilisé pour les textiles ne pouvant être lavés à 60° et la literie.
Mode d'administration	Pulvériser à 30-40 cm sur la totalité de leur surface : - le matelas qui sera aussitôt retourné, - les deux faces des couvertures, - les vêtements, en particulier à l'intérieur, en insistant sur les coutures, - l'intérieur des gants, chaussons, chaussures et éventuellement casques de moto. Laisser agir pendant 4 heures environ.
Contre indications, précautions d'emploi	- Ouvrir les fenêtres de la pièce dans laquelle la pulvérisation est effectuée, et laisser aérer au moins 3 heures. - Ne doit pas être utilisé par un asthmatique ou pulvérisé à sa proximité, même en dehors des périodes de crises. - La literie traitée ne doit pas être utilisée dans les 12 heures et le linge dans les 2 heures suivant l'application.
Remboursement SS	Non